

วารสารใหม่ประจำเดือน

มกราคม.....2557.....



วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี

UDONTHANI HOSPITAL MEDICAL JOURNAL

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556 Vol. 21 No. 2 May - August 2013

ISSN 0858-6632

วารสารการแพทย์โรงพยาบาล..

SERIALS



003051

bib:13399108548

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
นิพนธ์ต้นฉบับ	
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ศรียา จันทะโคตร สบ.	187
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ศิริพร สมโภชน์ : พย.บ.	194
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พิชชาพร ผลเดช : พย.บ.	206
การบริหารการเงินและประสิทธิภาพของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี พรสวรรค์ จันทโทภาส : สบ., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	216
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปก่อนซื้อ มาบริโภคของประชาชน จังหวัดอุดรธานี เทพี รอดชื่นเมือง สม. (การบริหารงานสาธารณสุข)	228
ผลของการบำบัดด้วยเทคนิคการปรับมโนภาพตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประลาทสัมพันธ์ ต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่มีปัญหาในการปรับตัว พิศวาท ชูลิขิต นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ	239
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด หออภิบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลหนองคาย นางสาว ลัดดา ยูวนิช , พยาบาลวิชาชีพ	249
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุดอกคูณและอาสาแม่ตาดารวม โรงพยาบาลขอนแก่น วิรัช มั่นในบุญธรรม วท.บ. ศศ.ม.	257

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากประทัดระเบิดกรณีศึกษาโรงพยาบาลอุดรธานี อรุณี มรกตพิทยารักษ์, ภาณุ อดกัลัน	265
ผลกระทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ปี 2555 พรสวรรค์ จันโทภาส : สบ., สมพร แวงแก้ว : สบ., วทม. (บริหารสาธารณสุข)	276
ประเมินการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัด ห่อผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น นัยนา นักรบไทย พย.ม.(การบริหารการพยาบาล)	291
จดหมายข่าวเภสัชสนเทศ (DIS newsletters) : อันตราย !!.....เกิด Gangrene จากการใช้ Norephinephrine (Levophed [®]) หน่วยเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลอุดรธานี	297
จดหมายข่าวเภสัชสนเทศ (DIS newsletters) : “ขนาดของ Simvastatin เมื่อใช้ร่วมกับ Amlodipine ไม่ควรเกิน 20 mg ต่อวัน” หน่วยเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลอุดรธานี	300